

## Clube de Tecnologia Cafeeira

### Época de podar, preste atenção para não atrasar

J.B. Matiello e Alysson V. Fagundes, Eng. Agr. MAPA/Fundação Procafé e Gustavo N.Rosa e Sinésio Leite Filho, CEPEC-Heringer

Estamos na época de colheita do café, sendo que alguns produtores já estão quase terminando. É preciso lembrar que também esta é a época ideal para a poda dos cafeeiros, onde ela for indicada.

Deve-se efetuar as podas no período entre o término da colheita e o reinício das chuvas, normalmente isso ocorre de junho a setembro. Muitos produtores, entretanto, atarefados com outros trabalhos, costumam deixar para podar mais tarde.

Pesquisas recentes, na Zona da Mata e Sul de Minas, mostram, claramente, a importância das podas cedo. Os quadros 1 e 2 trazem os resultados de produtividade nas diferentes épocas de poda. Verifica-se que os cafeeiros onde a recepa foi feita a partir de julho e o esqueletamento também mais cedo, em agosto, apresentaram recuperação mais rápida nas brotações e produções iniciais mais altas.

**Quadro 1.** Produtividades, em scs/ha, nas duas primeiras safras, em cafeeiros recepados em diferentes épocas, no ensaio em Martins Soares-MG, 2008.

TRATAMENTOS	PRODUTIVIDADE	PRODUTIVIDADE	Média
Épocas de recepa	2007 (scs/ha)	2008 (scs/ha)	
Julho	63,5 a	122,0 a	87,5 a
Agosto	57,0 a	111,9 ab	80,2 a
Setembro	46,5 b	114,9 ab	77,2 ab
Outubro	24,6 c	117,3 ab	71,4 b
Novembro	19,0 c	116,3 ab	65,8 b
Dezembro	4,2 d	85,1c	44,3 c

**Quadro 2.** Produtividades, em scs/ha, na primeira safra, em cafeeiros esqueletados e decotados em diferentes épocas, no ensaio em Varginha-MG, 2008.

TRATAMENTOS	PRODUTIVIDADE
Épocas de recepa	(scs/ha)
Julho	91,07 a
Agosto	86,78 a
Setembro	62,14 b
Outubro	33,39 c
Novembro	21,78 c
Dezembro	16,25 d

As podas, no geral, devem ser efetuadas sempre após uma safra alta ou na perspectiva de safra baixa no ano seguinte. Com isso, aproveitando o ciclo bienal de produção nos cafeeiros arábica, a perda de safra fica reduzida. Nos cafeeiros conillon, onde se faz a poda de produção, as hastes fracas, com pouca capacidade produtiva, devem ser eliminadas todos os anos.

As podas leves em cafeeiros arábica e as podas de produção no Conillon devem ser realizadas, também, o mais cedo possível, para promover a abertura das plantas, e, assim, melhorar as floradas.

## Clube de Tecnologia Cafeeira

Nas podas após geadas ou chuvas de granizo deve-se aguardar melhor a definição da altura em que as plantas irão brotar, assim evitando cortar mais que o necessário. Três meses após a ocorrência desses fenômenos já se pode verificar o tipo e a altura das podas mais adequadas podendo-se, então, efetuá-las.



Figura 1: crescimento dos ramos das podas realizadas desde julho até dezembro



Figura 2: Poda realizada em Julho



Figura 3: Poda realizada em Dezembro